

PYRANPET® 5%



PIRANTEL PAMOATO 14,412% SUSPENSIÓN ORAL

Código

401106

Composición

Cada 1 mL de producto contiene:

Pirantel pamoato 144,12 mg

(Equivalente a 50 mg de Pirantel base)

Excipientes c.s.p. 1 mL

Especie de destino

Perros y gatos.

Indicaciones

Control y tratamiento de parásitos internos, eficaz en perros contra *Toxacara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala* y *Trichinella spiralis*; en gatos contra *Toxacara cati* y *Toxascaris leonina*.

Vía de administración y dosis

Vía oral.

Perros: 5 mg de Pirantel base/kg P.V. (4 gotas de PYRANPET® 5%/kg P.V.)

Gatos: 20 mg de Pirantel base/kg P.V. (16 gotas de PYRANPET® 5%/kg P.V.)

Esquema Terapéutico Recomendado:

Cachorros: 2ª, 4ª, 6ª, 8ª y 10ª semanas de vida.

Adultos: 1 vez al mes.

Hembras en lactancia: 2 semanas después del parto.

Advertencias y precauciones especiales de uso

Idealmente debe ser administrado 30 minutos después de la comida.

Es posible que PYRANPET® 5% se separe en dos fases; agitar muy bien el producto antes de usar.

Efectos no deseados y reacciones adversas

La eliminación de los parásitos muertos puede generar diarrea leve, especialmente en casos de parasitosis moderada-severa; esta diarrea es de carácter transitorio, por efecto mecánico de la masa de parásitos muertos y por lo tanto, independiente del tipo de antiparasitario usado.

Contraindicaciones

No usar en casos de hepatopatías, desnutrición, deshidratación y anemia.

Uso durante preñez y lactancia

El uso de PYRANPET® 5% es seguro durante gestación y lactancia, si es utilizado en la dosis indicada.

Interacciones con otros medicamentos

Levamisol y otras drogas colinérgicas inhiben a Pirantel competitivamente por el sitio de acción.

Piperazina posee un mecanismo de acción antagónico (produce parálisis flácida) al de Pirantel.

Sobredosis

Aunque el producto posee un gran margen de seguridad (DL50 de Pamoato de Pirantel en perros es de 690 mg/kg, 138 veces la dosis terapéutica), no es aconsejable administrar una dosis mayor a la recomendada; las manifestaciones de toxicidad por sobredosis de Pirantel son diarrea, vómitos e inapetencia.

Período de eficacia

24 meses.

Almacenamiento

Mantener a temperatura ambiente (entre 15-30°C), en lugar seco, protegido de la luz, en su envase original, debidamente rotulado y bien cerrado.

Presentación

Estuche conteniendo frasco de plástico de 10 mL.

Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

Fabricado y distribuido por

Veterquímica S.A.

USO VETERINARIO
REG. SAG N°679