

# BACTICILINA® 100%



## TILOSINA 10% - POLVO ORAL

### Código

400039

### Composición

Cada 100 g de producto contienen:

Tilosina fosfato	11,07 g
(Equivalentes a 10 g de tirosina base)	
Excipientes c.s.p.	100,0 g

### Especie de destino

Cerdos y pollos *broiler*

### Indicaciones

Está indicado en pollos *broiler* para el tratamiento de enteritis necrótica provocada por *Clostridium perfringens* sensible a tilosina.

En cerdos está indicada para el tratamiento de neumonía enzótica provocados por *Mycoplasma hyopneumoniae* e lleitis causada por *Lawsonia intracellularis* sensible a tilosina.

### Vía de administración y dosis

Oral, administrado en el alimento.

Pollos *broiler*: 35 mg de Tilosina base (equivalentes a 350 mg de BACTICILINA® 100)/kg P.V./día, durante 5 a 7 días.

Considerando un consumo de alimento de un 10% de su peso vivo en pollos *broiler* administrar 3,5 kg de BACTICILINA® 100/tonelada de alimento.

Cerdos: 3 – 7 mg de tirosina base (equivalentes a 30 – 70 mg de BACTICILINA® 100)/kg P.V./ día, durante 21 días, según criterio del Médico Veterinario.

Considerando un consumo de alimento de un 5% de su peso vivo en cerdos administrar 0,6 – 1,4 kg de BACTICILINA® 100/tonelada de alimento.

### Modo de empleo

Para asegurar una correcta dosificación se debe considerar el consumo de alimento, según especie y etapa de desarrollo del animal a medicar; la proporción del alimento medicado en la ración diaria, frecuencia y duración del tratamiento. El consumo de alimento depende de la situación clínica del animal y de la época del año.

La administración del alimento medicado deberá realizarse en comederos destinados únicamente para tratamiento de los animales enfermos.

### Contraindicaciones

No administrar a animales con insuficiencia renal.

No aplicar a animales con sensibilidad conocida a algunos de los componentes del producto.

### Advertencias y precauciones especiales de uso

No administrar a individuos con deficiencia en la función renal, hembras gestantes o en lactancia.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

### Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores:

No administrar a hembras preñadas.

No administrar a hembras en lactancia.

### Sobredosis:

No se describen.

### Efectos no deseados y reacciones adversas

Se describen alteraciones en la flora digestiva de carácter pasajero. En cerdos se ha descrito ocasionalmente edema en la mucosa rectal, diarrea, eritema y prurito.

### Interacción con otros medicamentos

No administrar con otros antibióticos bactericidas. Se ha descrito sinergismo con tetraciclinas contra *Pasteurella*, este fenómeno podría ocurrir con otras bacterias.

### Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho.

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo, deberán eliminarse de forma adecuada y responsable. Los productos vencidos o no utilizados y los envases vacíos deben ser entregados a empresas autorizadas para proceder a su adecuada eliminación.

No eliminar envases vacíos ni residuos del producto en cursos de agua.

### Precauciones especiales para el operador.

Durante la manipulación del producto, evitar la inhalación y el contacto directo con piel y ojos, mediante el uso de elementos de protección como guantes, gafas, mascarilla y ropa de seguridad.

### Período de resguardo

Carne: Pollos *broiler* y Cerdos 7 días.

No administrar a aves cuyos huevos se destinen a consumo humano.

### Período de eficacia

12 meses. Utilizar inmediatamente una vez preparado.

Descartar el producto sobrante.

### Almacenamiento

Mantener a temperatura ambiente (15 – 30°C), en su envase original, bien cerrado, protegido de la luz.

### Presentaciones

Bolsa conteniendo 20 kg.

### Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

### Fabricado y distribuido por:

Veterquímica S.A.

**USO VETERINARIO**  
**REG. SAG N° 1983-B**