

TINTURA DE YODO 2%



SOLUCIÓN TÓPICA

Código

400786

Composición

Cada 100 mL de producto contienen:

Yodo	2 g
Yoduro de sodio	2,1 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

Especie de destino

Bovinos, ovinos, caprinos, caballos, camélidos sudamericanos, cerdos, perros y gatos.

Indicaciones

Antisepsia de piel antes de cirugías de todo orden.

Antisepsia de lesiones de piel.

Antisepsia de cordón umbilical en neonatos.

Vía de administración

Tópica.

Modo de empleo

Depilar el área a desinfectar; lavar con jabón y enjuagar. Aplicar con gasa o apósito en una sola dirección y dejar secar.

En caso de aplicaciones reiteradas en desinfección de lesiones, diluir en 3 partes de agua.

Contraindicaciones

Heridas profundas.

Quemaduras profundas.

Efectos no deseados y reacciones adversas

Aplicaciones reiteradas pueden causar formación de ampulas y excoriación dérmica.

Advertencias y precauciones especiales de uso

Lavar la zona de piel antes de aplicar el producto.

No usar reiteradamente en heridas abiertas, por su efecto irritante, destructor de tejido y retardador de la cicatrización.

La acción de los productos yodados disminuye en diluciones realizadas con aguas duras o en presencia de gran cantidad de materia orgánica.

Mantener el envase cerrado, para evitar alterar la concentración del producto por evaporación.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Uso Durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores

La Tintura de Yodo 2% puede ser aplicada en hembras preñadas y animales reproductores. En hembras en lactancia, puede ser usado, excepto en los pezones y alrededores, para evitar el consumo por parte de las crías.

Interacción con otros medicamentos

Limpiar muy bien la zona donde se va a aplicar la Tintura, para eliminar residuos de otros medicamentos tópicos que pudieran haber sido usados y que pudieran interferir en su eficacia antiséptica.

Sobredosis

No se describe.

Precauciones especiales para el operador.

Producto irritante; evitar el contacto directo con piel y ojos, mediante el uso de elementos de protección como guantes.

Principales incompatibilidades con otros productos

La tintura de yodo es incompatible con otros productos que contengan: amoníaco; sales de hierros, bismuto, cobre, plomo o mercurio; agentes oxidantes como clorato de potasio o sales alcaloides.

Período de resguardo

Leche: 0 (cero) hr

Carne: 0 (cero) días.

Período de eficacia

24 meses.

Almacenamiento

Mantener a temperatura ambiente (15-30 °C) en lugar seco, protegido de la luz, en su envase original bien cerrado.

Presentaciones

Frasco de 1 L de producto.

Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

Fabricado y distribuido por

Veterquímica S.A.

USO VETERINARIO.
Chile Reg. SAG N° 1213

Página 1 de 1

Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl

Chile: Camino a Lonquén 10387 - Maipú - Santiago / Francisco Bilbao 1469 - Osorno / Bernardino 1986 - Puerto Montt /

Teléfono 56-2 2384 4000.

Bolivia: Av. Piraí 493 - Santa Cruz / Teléfono 591-52 0261

Perú: Av. Huarochirí Mz E - Lote 20 - Urb Sta. Raquel (3ª etapa) - Lima. / Teléfono: (51-1) 3482517

www.veterquimica.com

 **VETERQUÍMICA**
CREANDO SALUD ANIMAL