

# SOSTÉN CG®



CONDROITIN SULFATO 12%, GLUCOSAMINA SULFATO - SOLUCIÓN INYECTABLE

## Código

500996

## Composición

Cada mL de solución inyectable contiene:

Condroitín sulfato	120 mg
Glucosamina sulfato	200 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

## Especie de destino

Perros, gatos y caballos.

## Indicaciones

Ayuda en la regeneración osteoarticular y apoyo en el tratamiento antiartrósico.

## Vía de administración y dosis

Aplicar por vía subcutánea o intramuscular.

## Perros y gatos:

Dosis de ataque en casos agudos: Dolor en espíndiloartrosis, compresión medular, dolor y deformaciones articulares en displasia de cadera: 0,5 mL de producto cada 10 kg de peso (60 mg condroitín sulfato y 100 mg glucosamina sulfato/10 kg de peso), una dosis diaria durante 3 a 4 días.

Dosis de mantención para casos crónicos: 0,5 mL de producto cada 10 kg de peso (60 mg condroitín sulfato y 100 mg glucosamina sulfato/10 kg de peso), dos veces por semana por 45-60 días según criterio profesional.

## Caballos:

5 mL de producto como dosis media para animales de 400 kg de peso (600 mg condroitín sulfato y 1000 mg glucosamina sulfato/400 kg de peso). Una aplicación cada 5 o 7 días por 45-60 días.

En casos agudos: una dosis diaria durante 3 a 4 días, continuando después de 5 días hasta la remisión de los síntomas, según criterio profesional.

El tiempo de administración depende del grado de artrosis, intensidad de los factores condicionantes de artrosis secundaria y a la capacidad individual de respuesta.

## Contraindicaciones

No utilizar en procesos infecciosos.

No utilizar en animales con hipersensibilidad a algunos de sus componentes

No administrar en hembras preñadas o en lactancia, ni en animales reproductores.

No utilizar en conjunto con corticoides por el efecto catabólico de los mismos.

## Advertencias y precauciones especiales de uso

No existen precauciones especiales para el uso de este producto.

Sin embargo se recomienda tomar las medidas de asepsia que requiere la administración de una solución inyectable.

Mantener fuera del alcance de niños y de animales domésticos.

## Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores

No administrar en hembras preñadas o en lactancia, ni en animales reproductores.

## Sobredosis

Estas sustancias son componentes naturales del organismo, no son tóxicas, son absorbidas y metabolizadas por las vías naturales. No se ha demostrado ningún efecto tóxico, efectos colaterales o cambios clínicos, bioquímicos o hematológicos por la administración de glucosamina y condroitín sulfato durante 6 meses a la dosis indicada.

## Efectos adversos y reacciones adversas

No se han descrito.

## Interacción con otros medicamentos

No administrar en conjunto con corticoides por el efecto catabólico de los mismos.

## Período de resguardo

No utilizar en caballos destinados a consumo humano.

## Período de eficacia

2 años. Utilizar inmediatamente una vez abierto el envase, y descartar el producto sobrante.

## Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco entre 15-25°C.

## Presentaciones

Frasco ampolla conteniendo 5 mL.

## Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

## Fabricado por

Laboratorio Lumai S.R.L.

## Para

Laboratorio Mayors S.R.L.

## Importado y distribuido por

Veterquímica S.A.

**USO VETERINARIO  
REG. SAG N° 1752.**