



IPE-VAC[®] 2 INMERSIÓN

VACUNA INACTIVADA CONTRA LA NECROSIS PANCREÁTICA INFECCIOSA. SUSPENSIÓN ACUOSA PARA INMERSIÓN

Código
402597

Composición

Cada 1 mL contiene:

Virus IPN, cepa VQ-IPNv-001, Serotipo Sp $1 \times 10^8 - 3 \times 10^8$ TCID₅₀

Virus IPN, cepa VQ-IPNv-003, Serotipo WB1 $1 \times 10^8 - 3 \times 10^8$ TCID₅₀

Excipientes csp 1,0 mL

Inactivante: Solución de formaldehído

Adyuvantes: Polímero acuoso y saponina

Preservante: Cloruro de benzalconio

Especies de destino

Salmón del Atlántico (*Salmo salar*), Salmón coho (*Oncorhynchus kisutch*), Trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) y Salmon Chinook (*Oncorhynchus tshawytscha*).

Indicaciones

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Necrosis Pancreática Infecciosa producida por virus serotipos Sp y WB, en Salmón del Atlántico, Salmón coho, Trucha arcoíris y Salmón Chinook a partir de los 0,5 gramos.

Dosis, vía de administración y modo de empleo

Agitar vigorosamente antes de usar. Se debe detener el flujo de agua en el estanque y mantener con un mínimo de 8 ppm de oxígeno disuelto (DO).

Preparar una dilución de 1 L de vacuna por cada 1.000 L de agua dulce del estanque. Para ello, previamente se diluye 1 L de la vacuna en 10 L de agua dulce del estanque. Luego esta solución se aplica al estanque con 990 L de agua dulce para su debida homogenización. Una vez preparada la dilución, las vacunaciones se deben realizar en el lapso máximo de 2 horas. La biomasa posible de inmunizar por unidad de volumen de suspensión vaccinal es de 25 kg/L de vacuna.

Sumergir los peces durante 1 hora para que el proceso de vacunación sea óptimo.

Contraindicaciones

- No vacunar durante el proceso de smoltificación.
- No vacunar peces reproductores.
- No efectuar otros tratamientos con los peces durante el proceso de vacunación.
- No vacunar peces enfermos, débiles o estresados.



IPE-VAC[®] 2 INMERSIÓN

VACUNA INACTIVADA CONTRA LA NECROSIS PANCREÁTICA INFECCIOSA. SUSPENSIÓN ACUOSA PARA INMERSIÓN

-No vacunar peces con lesiones o infecciones cutáneas o branquiales, ni en situaciones de déficit de oxígeno o presencia de algas y/o microalgas.

-No vacunar peces que hayan sido recientemente transportados desde otro lugar al sitio de vacunación, incluyendo un tiempo mínimo de 12 horas de descanso pre-vacunación.

Advertencias y precauciones especiales de uso

No exceder la aplicación por más de 1 hora y 15 min.

La aplicación debe hacerse a peces con ayuno previo de 24 horas.

Los peces deben nadar libremente en el estanque durante la aplicación de la vacuna, no superando una densidad de 35 kg/m³.

No realizar más de 16 inmersiones con la misma solución preparada 1:1000.

No aplicar cuando las condiciones del agua estén alteradas especialmente por presencia de materia orgánica y sedimentos que aparecen después de las lluvias.

Una vez aplicada la vacuna, no trasladar los peces al mar antes de las 300 UTA.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Período de resguardo

0 grados días.

Período de eficacia

18 meses.

Almacenamiento

Mantener refrigerado. Entre 2 y 8°C. No congelar. Una vez abierto, utilizar en su totalidad.

Presentaciones

1 L.

Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

Fabricado y distribuido por Veterquímica S.A.

Razón de cambio

Actualización de formato (02-05-2023)

USO VETERINARIO
REG. SAG N°2492-BP



VETERQUÍMICA[®]
CREANDO SALUD ANIMAL