

SINCROCIO®



Cloprostenol 0,25 mg/mL - Solución Inyectable

Código

501482

Composición

Cada 1 mL contiene

Cloprostenol sódico 0,2630 mg

(equivalente a 0,25 mg Cloprostenol base)

Excipientes c.s.p. 1 mL

Especie de destino

Bovinos (vacas y vaquillas), caballos y cerdos.

Indicaciones de uso

Sincrocio® es un potente agente luteolítico. Su acción da origen a la regresión morfológica del cuerpo lúteo (luteólisis) seguida por el retorno al celo y normal ovulación.

Indicado para sincronización e inducción del celo en vacas y yeguas o en protocolos reproductivos o terapéuticos en los que se requiere luteólisis, reducción de los niveles de progesterona o contracción del miometrio.

En cerdas está indicado sólo para la inducción del parto.

Vía de administración y dosis

Bovinos: Sincronización e inducción del celo: 2 mL de Sincrocio por vía intramuscular, en dosis única o a criterio del médico veterinario.

Administrar Sincrocio® sólo a hembras con evidencia palpable de cuerpo lúteo, observar durante 6 días la presencia de celo e inseminar o cubrir aquellas hembras que lo presenten.

Repetir el tratamiento con Sincrocio® el sexto día a todas las hembras que no hayan presentado celo.

La actividad luteolítica de Sincrocio® puede utilizarse para controlar el patrón de reproducción del ganado, sin embargo, solo será eficaz en hembras en ciclo, con una puntuación corporal adecuada y en presencia de un cuerpo lúteo funcional.

Tratamiento de endometriosis y piometra: 2 mL por vía intramuscular. El tratamiento puede repetirse a los 10 a 14 días. **Tratamiento de vacas que tienen cuerpo lúteo funcional pero no expresan estro:** 2 mL por vía intramuscular, en dosis única.

Interrupción de gestación normal o anormal (fetos momificados):

Gestación hasta 150 días: 2 mL por vía intramuscular.

Gestación sobre 150 días: 2 mL por vía intramuscular con asociación a corticosteroides.

Inducción del parto (después del día 270 de gestación) 2 mL por vía intramuscular con asociación a corticosteroides

Caballos: Sincronización e inducción del celo: 1 mL por vía intramuscular. Administrar Sincrocio® sólo a hembras con evidencia palpable de cuerpo lúteo, insemine o cubra a la yeguas en la detección del próximo celo. Repetir el tratamiento con Sincrocio® a todas las hembras que no hayan presentado celo. La actividad luteolítica de Sincrocio® solo será eficaz en hembras en ciclo, con una puntuación corporal adecuada y en presencia de cuerpo lúteo de 6 a 11 días.

Tratamiento de la endometriosis/ metritis/piometra: 1 mL por vía intramuscular en dosis única o repetir en 12 o 24 hrs. El procedimiento generalmente se combina con la administración de oxitocina. **Interrupción de gestación normal o anormal:** en gestación hasta 35 días 1 mL por vía intramuscular, en dosis única. En gestación sobre 35 días 1 o 2 mL a cada 12 o 24 horas hasta que ocurra el aborto. Pueden ser necesarias hasta 4 dosis para lograr el aborto.

Inducción del parto: 1 mL vía intramuscular, repetir la dosis 30 minutos después, el procedimiento generalmente se combina con la administración de oxitocina. **Tratamiento cuerpo lúteo persistente (anestro, diestro prolongado, pseudopreñez, muerte embrionaria temprana):** 1 mL vía intramuscular, en dosis única.

Cerdos: Inducción del parto: 0,7 mL por vía intramuscular o 0,3 a 0,5 mL por la submucosa vulvar.

Para la inducción del parto, Sincrocio® solo debe utilizarse en hembras que tengan un período de gestación próximo a la fecha de parto (mínimo 112 días de gestación), pudiendo inducir el parto en un intervalo de 18 a 36 horas.

Advertencias y precauciones especiales de uso

Utilizar sólo en vacas/vaquillas, yeguas y cerdas y en la dosis recomendada. Sólo el médico veterinario puede realizar ajustes a la posología del producto.

La respuesta del uso de hormonas para la sincronización del estro depende del estado general del animal y a la ausencia de causas que puedan disminuir la fertilidad, como enfermedades reproductivas o endocrinas. El manejo nutricional y sanitario correcto de los animales es esencial, ya que las características reproductivas son de baja heredabilidad, en consecuencia están mucho más influenciadas por el medio ambiente.

Los análogos de PGF2α no inducen ciclicidad en hembras que no tienen actividad ovárica, ni exacerban los signos y síntomas del estro de tal manera que lo hagan más visible.

Cuando se utiliza un análogo de PGF2α para interrumpir la gestación y extraer un feto momificado, puede ser necesario extraer el feto de manera manual ya que la ausencia de líquidos dificulta el paso y la expulsión al exterior.

Página 1 de 2

Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl

SINCROCIO®



Cloprostenol 0,25 mg/mL - Solución Inyectable

La inducción del parto en las cerdas antes de las 72 horas de la fecha prevista del parto puede provocar la muerte de los lechones. La inducción del parto o el aborto con cualquier compuesto exógeno puede precipitar distocia, muerte fetal, placenta retenida y / o metritis. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Efectos adversos y reacciones adversas

En yeguas se describe la aparición de cólicos, agitación, sudoración, dificultad respiratoria, heces blandas y reacción en el sitio de inyección. En vacas se puede observar salivación, diarrea, malestar abdominal y dificultad respiratoria. Ningún efecto adverso fue correlacionado al uso del producto en cerdos

Contraindicaciones

No administrar en animales con hipersensibilidad al principio activo o algún excipiente. No usar en animales que padecen desórdenes gastrointestinales o respiratorios

Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores

No debe ser administrado a hembras preñadas, excepto si el objetivo es la inducción del parto o interrupción de la gestación. No hay antecedentes que el producto esté contraindicado en hembras en lactancia.

Sobredosis

En yeguas se describe la aparición de cólicos, agitación, sudoración, dificultad respiratoria y heces.

En vacas se puede observar salivación, diarrea, malestar abdominal y dificultad respiratoria.

Una sobredosis no acelerará la regresión del cuerpo lúteo.

Los efectos secundarios de la sobredosis de cloprostenol son usualmente casuales y transitorios, sin embargo, no son perjudiciales para los animales.

No existen antídotos disponibles para el cloprostenol. El tratamiento es sintomático.

En casos de sobredosis de cloprostenol en vacas, a la dosis 5 - 10 veces la dosis recomendada, se han relatado efectos colaterales como incremento de la temperatura rectal y salivación. Efectos secundarios leves como malestar, ligera espuma y disminución en la producción láctea han sido relatados tras la administración de 50 - 100 veces la dosis recomendada.

Una sobredosis de 200 veces la dosis recomendada puede también causar diarrea leve y transitoria en el ganado.

Se han informado incremento del ritmo cardíaco, incremento de la frecuencia respiratoria, cólico, agitación, ataxia, sudoración, dificultad

para respirar, heces blandas y reacción en el sitio de aplicación en yeguas. Tales reacciones generalmente son pasajeras y el uso de analgésicos puede aliviar el cólico.

En cerdas, no se notificaron efectos adversos de cloprostenol después de la administración intramuscular única en dosis de 5 - 10 veces la dosis recomendada.

Si nota cualquier otro efecto secundario, contacte al médico veterinario.

Interacción con otros medicamentos

En cerdas, el uso de prostaglandinas en combinación con oxitocina en dosis superiores a 30UI puede provocar la estimulación de la actividad miometrial seguida de agotamiento uterino, lo que puede disminuir el tiempo de parto y el intervalo de expulsión de expulsión, aumentar el número de roturas sumado a hemorragias en el cordón umbilical. AINES pueden inhibir la síntesis de prostaglandinas endógenas.

Precauciones especiales para el operador.

Durante la manipulación del producto evite su contacto con piel y mucosas mediante el uso de elementos de protección como guantes, mascarilla, gafas y ropa de seguridad. Manipular el producto con cuidado, no se recomienda que mujeres embarazadas, asmáticos u personas con problemas respiratorios manipulen el producto. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente.

Período de Resguardo

Leche: cero (0) días.

Carne: cero (0) días.

Periodo de eficacia

36 meses. Una vez abierto, utilice el producto dentro de 6 meses

Almacenamiento

Conserve el producto en su envase original, en un lugar seco y fresco, a temperatura ambiente menor a 30°C. No refrigerar ni congelar.

Presentación

Frascos de 20 o 50 mL.

Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria retenida.

Fabricado por

Ourofino Saudé Animal Ltda.

Importado y distribuido por

Veterquímica S.A.

USO VETERINARIO
REG. SAG N°2585